

# វិធានការបង្ការនៃ វីរុសគ្រុនផ្តាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

គោលបំណងនៃវិធានការបង្ការនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

- 1 វីរុសគ្រុនផ្តាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកចូលក្នុងកសិដ្ឋានតាមរយៈឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន យានយន្ត ទំនិញ និងមនុស្ស។
- 2 កសិដ្ឋានត្រូវតែមានការការពារក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីរារាំងការហូរចូលនៃវីរុសតាមរយៈឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន យានយន្ត, ទំនិញនិងមនុស្សដែលមានគំនិតថា “ខ្ញុំជាអ្នកការពារកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ”

## 1. នៅជុំវិញកសិដ្ឋាន (ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន, ឧបករណ៍យានយន្ត, មនុស្ស)



ដំឡើងរបងរឹងមាំនៅខាងក្រៅកសិដ្ឋានហើយប្រើថ្នាំបាញ់ដេញសត្វត្រូវតាមបណ្តាញបណ្តាញដែលមានស្រាប់។  
\* របងគ្រប់គ្រងនឹងឱ្យកសិដ្ឋានជុំវិញកសិដ្ឋានដែលមានកម្ពស់ 1,5 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងនេះ។



ដាក់កំបោរទៅលើបរិវេណនៃកសិដ្ឋានដោយយន្តមានទំងន់ជាង 50 សម និងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគឱ្យក្រោមគ្រប់ផ្ទៃក្នុងកសិដ្ឋាន។



ប្រសិនបើសត្វជ្រូក (ឬសត្វដទៃទៀត) ត្រូវបានគេរកឃើញនៅជុំវិញកសិដ្ឋានសូមទាញទៅក្រៅស្ថានភាពនៃកសិដ្ឋានបង្ការមេរោគឱ្យក្រោមគ្រប់ផ្ទៃក្នុងកសិដ្ឋាន។



កុំនាំយកផលដំណាំ និងចំបើងដែលផលិតនៅតំបន់ (ដឹកសត្វ) ដែលជ្រូកត្រូវបានពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់។



កុំយកឧបករណ៍ (ក្រាស់ ទំនៀម ម៉ាស៊ីនប្រគល់ ជាដើម) ដែលបានប្រើនៅខាងក្រៅកសិដ្ឋានចូលក្នុងកសិដ្ឋាន។



យានយន្តដឹកបន្លូនត្រូវតែចូលក្នុងកសិដ្ឋានកាន់តែតិចតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។  
- សម្លាប់មេរោគ បន្ទាប់ពីយកចេញស្រោចស្រាវជ្រាវដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគ និងថ្នាំកំប្រាំងខាងក្រោមនៃយានយន្ត និងសម្លាប់មេរោគលើកំរិតសម្លាប់មេរោគដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគ។



លាងសម្អាតតំបន់ជុំវិញកសិដ្ឋាន សម្រាប់មេរោគលើសម្លៀកបំពាក់ការងារ មួក និងស្បែកជើងរាល់ថ្ងៃ ហើយលាងសម្អាតឱ្យបានគ្រប់ 2-3 ថ្ងៃម្តង។  
\* បន្តប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលមានស្រាប់ (គំនរសំណល់ស្បែក គ្រាប់ ជាដើម) ដើម្បីការពារមួស និងដកស្ទួយចេញពីក្បាលសត្វ។



ហាមឃាត់អ្នកខាងក្រៅមិនឱ្យចូលលើកលែងតែករណីដែលត្រូវការសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។  
\* ការហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាតនេះត្រូវអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ និងកសិករត្រូវចូលកសិដ្ឋាន។  
\* គ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវការចូល និងចេញច្រកចូល និងចេញច្រកចូលផ្សេងទៀតលើកលែងតែច្រកចូលច្រកចេញនៃកសិដ្ឋាន។



មន្ត្រីកសិដ្ឋានត្រូវចូលមកក្នុងកសិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។  
\* កុំទៅទស្សនាទីប្រកបដោយស្បែកសត្វដែលស្លាប់នៅជុំវិញកសិដ្ឋាន។

## 2. នៅខាងក្នុងកសិដ្ឋាន (ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន, ឧបករណ៍យានយន្ត, មនុស្ស)



រក្សាផ្នែកខាងក្នុងកសិដ្ឋានឱស្រាត និងសម្ភាតជាទៀងទាត់ និងសម្លាប់មេរោគជីកំប៉ុសកន្លែងស្តុកចំណី (ធុងចំណី), គ្រឿងផឹកជញ្ជូន ជាដើម។




ការទូកដាក់វត្តធាតុ (ចំណី សំណល់ សំណល់អង្កាម សំនាមចំបើង ជាដើម) ដែលអាចជាចំណីអាហារសម្រាប់សត្វព្រៃលើគោក និងសត្វ បក្សីព្រៃនៅក្នុងកសិដ្ឋានត្រូវបានហាមឃាត់។



កំឡុងកាលសព្វសត្វស្ងួតដែលបរលូតក្នុង បូស្តក ជាដើម ដោយមិនប្រុង ប្រយ័ត្ន នៅកសិដ្ឋាន ឬចន្លោះចេលវារទៅក្នុងរណ្ដៅជីកម៉ឺន។  
ប្រើប្រាស់ឈាមសត្វស្ងួតចេញ បូស្តកម្នាក់ប្រសព្វរឺមហិន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ  
ដោយបង្កើតជាដើម្បីស្រាវជ្រាវដង្ហែរត្រកូត



ដំឡើងរបងលួសព័ទ្ធជុំវិញប្រឡាយ និងស្នាមច្រេះនៅក្នុងកសិដ្ឋាន និងរបងលួសដេញបាញ់នៅជុំវិញកន្លែងដាក់ដំបូស ឃ្លាំងស្តុកចំណី និងឃ្លាំងស្តុកចំប៉េង (ចំប៉េង)។



កុំឱ្យសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋាន(ផ្អែម ជាដើម)ដើរចុះឡើងជុំវិញហើយ  
ចងខ្សែវានៅទីតាំងដែលបានកំណត់នៅក្នុងកសិដ្ឋាន។

\* គ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវការបើក និងបិទច្រកចូលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យពួកវាចេញពីកសិដ្ឋាន



លាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឧបករណ៍ដូចជាឡានចូកដែលប្រើក្នុង  
កសិដ្ឋានជាទៀងទាត់ថ្ងៃហើយទុកវានៅក្នុងឃ្លាំងស្តុករបស់កសិដ្ឋាន

\* ត្រូវសម្លាប់មេរោគ និងវិវាចនាមេរោគដោយប្រើការស្រាវជ្រាវ (PI) នៅពេលរក្សាទុកជាសិទ្ធិ។



ទីតាំងត្រូវតែបំបែកដោយកន្លែងសម្លាប់មេរោគផ្ទាល់ខ្លួន និងបន្ទប់លាង  
សម្លាប់មេរោគជើងនៅច្រកចូលកសិដ្ឋានដើម្បីលាងសម្អាតយ៉ាងហ្មត់  
ចត់ និងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីមនុស្សដែលចូល។




បន្ទប់ការពារដំបីត្រូវតែដំឡើងនៅច្រកចូលកសិដ្ឋានដើម្បីកាត់មេរោគ  
ដែលមានលើមនុស្សដែលចូល។


\* អ្នកដែលចូលត្រូវតែដូតទឹក ឬសម្លាប់មេរោគ/ផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ (ស្បែកដើ ង កន្ទែង) បន្ទាប់មក អាចធ្វើសកម្មភាពនៅលើកសិដ្ឋានបាន។

1588-9060  
1588-4060

### 3. នៅខាងក្នុងក្រោល (ឧបករណ៍ផឹកដំឡូង, ផលិតផល, មនុស្ស)



សម្អាតនិងសម្រាប់មេរោគផ្នែកខាងក្នុងនៃកោលសតយ៉ាងទៀងទាត់។



បិតារាល់ប្រហោងនៅក្នុងក្រោលរាងការចូលរបស់សត្វល្អិតកណ្តុរ និងរុយដោយដំឡើងសំណាត់និងសំណាត់សត្វល្អិត។

- ສ້າງໂຮງສຳມາດກຳລັງສູນສະໜັບສະໜູນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈາກການສຳຫລາດຕາຍຂອງ  
ຊື່ສະໜອງ (ເກີດ) ມີ


\* ផ្ទៃក្នុងប្រាសាទប៉ុប្រុយ អន្ទាក់កណ្តាលអំពូលសត្វល្អិតនិងថ្មីសម្លាប់មេរោគ និងថ្មីសំលាប់សត្វល្អិតនិងថ្មីកំចាត់សត្វកណ្តាល និងបុរេ។



ជ្រក និងបសុសត្វដែលត្រូវបាននាំចូលថ្មីៗ គួរតែត្រូវបានព្យាករណ៍ដាច់ពី គ្នានៅក្នុងក្រោលដាច់ដោយឡែក និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់រហូត ដល់វាត្រូវបានផ្លាស់ទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រកមួយទៀត។



វត្តដែលប៉ះពាល់ជាមួយសត្វជ្រូក (សិរីរាង ឧបករណ៍បញ្ចូលមេជីវិតសិប្បនិម្មិត បីដងខ្យល់ ជាដើម) ត្រូវតែបំបែកសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគចោលជាប្រចាំនិងរក្សាទុកកងយ៉ាងឆ្លងខាងក្នុងដោយមិនយកទៅខាងក្រៅ។



ដំឡើងបន្ទប់ខាងមុខនៅច្រកចូលក្រាលដំបូងនគររដ្ឋបាលផ្លូវស្គាល់ស្គាល់  
ច្រកជើងកង្វែង និងសម្លៀកបំពាក់ហើយពួកគេត្រូវទៅពាក់សម្លៀក  
បំពាក់ការងារ និងស្បែកជើងកង្វែងដែលបានកំណត់ហើយលាងដៃឱ្យ  
ស្អាត។