

# มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรภายในฟาร์มเลี้ยงสุกร

## จุดประสงค์ของมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรภายในฟาร์มเลี้ยงสุกร

- 1 ไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่เข้าไปในฟาร์มผ่านพาหะนำโรค, รถยนต์, สิ่งของและมนุษย์
- 2 โดยทางฟาร์มจะต้องตระหนักเสมอว่า 'ฟาร์มของเรา เราป้องกันเอง' และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อรับการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านพาหะนำโรค, รถยนต์, สิ่งของและมนุษย์

### 1. รอบฟาร์ม (พาหะนำโรค, อุปกรณ์ยานพาหนะ, มนุษย์)



สร้างรั้วที่แข็งแรงด้านนอกฟาร์ม และนำสารป้องกันสัตว์ป่ามาใช้ในบริเวณเส้นเขตแดนอย่างทั่วถึง  
\* สร้างรั้วที่มีความสูงมากกว่า 1.5m รอบๆ ฟาร์ม โดยไม่ให้มีช่องว่าง



โรยปูนขาวความกว้าง 50 ซม. รอบๆ ฟาร์ม และทำการฆ่าเชื้อเส้นทางที่ใช้เข้าฟาร์มเป็นระยะ



กรณีที่พบเห็นหมาป่า (หรือขาคศพหรืออุจจาระ) บริเวณฟาร์ม ให้แจ้งไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อมหรือกรมป้องกันโรคระบาดทันที



ไม่นำพืชผล, ฟางข้าว ฯลฯ จากบริเวณที่พบหมาป่า (พื้นที่ทางการเกษตร) เข้ามาภายในฟาร์ม



ไม่นำเครื่องมือ (รถแทรกเตอร์, รถไถ เป็นต้น) ที่ใช้งานด้านนอกฟาร์มเข้ามาภายในฟาร์ม



ไม่นำยานพาหนะที่ใช้ดำเนินงานด้านปศุสัตว์เข้ามาในฟาร์มโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- เข้าเชืหลังจากขจัดอินทรีย์วัตถุออก เช่น ดินที่ติดอยู่ตามล้อและช่วงล่างของรถยนต์ และทำการฆ่าเชื้อบริเวณที่จอดรถด้วยโซลูชันฆ่าเชื้อทั่วไป



ทำความสะอาดบริเวณฟาร์มให้สะอาด, ฆ่าเชื้อชุดทำงาน, หมวก, รองเท้า ฯลฯ ทุกวัน และซักด้วยเว้นช่วง 2-3 วันต่อครั้ง

\* ซ้ำเชืบริเวณสิ่งแวดล้อมรอบๆ คอกปศุสัตว์ (กองขยะ, หนองน้ำ, พงไม้) ที่อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝูง และดูแลกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง



ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกเด็ดขาด ยกเว้นกรณีที่มีความเสี่ยงไม่ได้ เช่น การตรวจรักษาโรค

\* ห้ามไม่ให้ผู้ล่าสัตว์และผู้ทำการเกษตรเข้าออกฟาร์มโดยเด็ดขาด

\* ใส่ใจกับการปิดประตูเข้าออก และปิดประตูเข้าออกอื่นๆ ยกเว้นทางเข้าออกหลักของฟาร์ม



ห้ามผู้ดูแลฟาร์มทำกิจกรรมล่าสัตว์หรือออกไปป็นเขา

\* ห้ามไปยังแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า, บ่อน้ำ หรือพื้นที่ทางการเกษตรที่พบหมาป่า

## 2. ภายในฟาร์ม (พาหนะนำโรค, อุปกรณ์ยานพาหนะ, มนุษย์)



รักษาความสะอาดภายในฟาร์ม และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อปัยอินทรีย์, อุปกรณ์เก็บอาหารสัตว์ (ถังอาหารสัตว์), อุปกรณ์สำหรับขนส่งเป็นต้น




ห้ามทิ้งสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์บกและสัตว์ปีก (อาหารสัตว์, อาหารที่กินเหลือ, แกลบ, เศษฟาง เป็นต้น) ภายในฟาร์ม



ห้ามปล่อยทิ้งซากสัตว์ ตัวอ่อนจากสัตว์ที่แท้งลูกหรือรก ฯลฯ ในฟาร์ม หรือนำไปทิ้งในโรงหมักปัยอินทรีย์  
\* ใช้อุปกรณ์กำจัดซากสัตว์ หรือบริษัทที่ให้บริการเพื่อจัดการอย่างปลอดภัยตามหลักป้องกันโรคระบาด



ติดตั้งตาข่ายตาถี่ภายในฟาร์ม เช่น ทางระบายน้ำและช่องโหว่ต่างๆ และติดตั้งตาข่ายป้องกันนกในบริเวณโรงเก็บปัยอินทรีย์, โกดังเก็บอาหารสัตว์ และโกดังเก็บฟาง (แกลบ) เป็นต้น



ห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยง (สุนัข, แมว เป็นต้น) แบบปล่อยภายในฟาร์ม ให้เลี้ยงแบบล่านไว้ในสถานที่ที่กำหนดภายในฟาร์ม  
\* ใส่ใจกับการเปิดประตูเข้าออก และดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปนอกฟาร์ม




ชะล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมือที่ใช้ภายในฟาร์มทุกวัน เช่น รถตักเอนกประสงค์ จากนั้นนำไปเก็บไว้ในจุดเก็บสิ่งของภายในฟาร์ม  
\* ให้ฆ่าเชื้อและทำไม่ปราศจากเชื้ออยู่เสมอโดยใช้รังสียูวี(UV) เมื่อดำเนินการจัดเก็บ



ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับบุคคลและบ่อสำหรับจุ่มรองเท้าในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวตรงทางเข้าฟาร์มเพื่อฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง และบันทึกข้อมูลผู้เข้าออกอย่างละเอียด




สร้างห้องป้องกันโรคไวที่ทางเข้าฟาร์มเพื่อฆ่าเชื้อผู้เข้าออกอย่างพิถีพิถัน  
\* ผู้เข้าออกต้องอาบน้ำหรือฆ่าเชื้อและเปลี่ยนชุด(รองเท้าบูท) จากนั้นจึงปฏิบัติงานในฟาร์ม




1588-9060  
1588-4060


## 3. ภายในคอกปศุสัตว์ (พาหนะนำโรค, อุปกรณ์ยานพาหนะ, มนุษย์)



ใส่ใจทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในคอกปศุสัตว์เป็นประจำ




ป้องกันการบุกรุกเข้าไปในคอกปศุสัตว์ของแมลง เช่น แมลงวันและหนู โดยการอุดรูคอกปศุสัตว์ และติดตั้งตาข่ายและมุ้งลวดกันแมลง  
- ติดตั้งมุ้งลวดบริเวณพัฒนาอากาศหรือช่องถ่ายเทอากาศ(หน้าต่าง) เพื่อป้องกันไม่แมลง, สัตว์ปีก ฯลฯ เข้ามาด้านใน  
\* วางกระดาษกาวกับดักหนูตะกึ่งไล่แมลง และยาฆ่าพยาธิและสารป้องกันแมลงเพื่อกำจัดหนูและแมลงวัน



สำหรับสุกรหรือปศุสัตว์ที่รับเข้ามาใหม่ ให้แยกในคอกคัดแยกที่ฆ่าเชื้อแล้ว พร้อมทั้งสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดก่อนย้ายไปยังคอกอื่น



ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของที่สัมผัสสุกรโดยตรง (เช่น เข็มฉีดยา, อุปกรณ์ผสมเทียม, หัวฉีด เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง และไม่ให้นำออกนอกฟาร์ม โดยเก็บไว้ในกล่องเก็บสิ่งของด้านใน



จัดห้องไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าคอกปศุสัตว์สำหรับเปลี่ยนรองเท้าบูทและชุดทำงานและเมื่อจะเข้าไปในคอกปศุสัตว์จะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทและชุดเฉพาะทางที่กำหนดให้ และล้างมือให้สะอาดอย่างทั่วถึง